TRICOLOCION 5%

MINOXIDIL

Solución tópica

Uso externo - Uso exclusivo para hombres

FORMULA
Cada 100 ml de solución tópica contiene ***Minoxidil*** 5 g. Excipientes: Propilenglicol; Alcohol etílico; Butilhidroxitolueno; EDTA disódico; Metabisulfito de sodio; Agua purificada.

ACCION TERAPEUTICA
Estimulante del crecimiento capilar.

PROPIEDADES
Minoxidil estimula el crecimiento capilar en individuos con alopecia androgenética. El mecanismo de acción no ha sido aún totalmente dilucidado, pero se acepta que posiblemente incremente el flujo sanguíneo como resultado de la inducción de vasodilatación, estimulando así los folículos pilosos para pasar de una fase telógena (reposo) a una fase anágena (crecimiento activo). El comienzo de la acción suele observarse luego de 4 meses de iniciado el tratamiento, con un aumento progresivo del efecto hasta el primer año, a partir del cual se produce una estabilización.

INDICACIONES
Está indicado para el crecimiento del pelo en la coronilla del cuero cabelludo (vértice), en alopecia androgenética. No está destinado a la calvicie frontal o entradas laterales.

POSOLOGIA / MODO DE ADMINISTRACIÓN
Aplicar (atomizar) con el atomizador 2 veces por día, directamente sobre el cuero cabelludo, en el área de pérdida del cabello.
Utilizando más cantidad o usándolo más frecuentemente no mejoran los resultados.
No utilizar en otras partes del cuerpo.

UTILIZACION
Lavar el cabello con champú a la mañana antes de una primera aplicación. Colocar la solución sobre el área afectada (con el cabello ya seco) mediante un masaje fino. Lavar cuidadosamente las manos luego de haberse aplicado la solución. Se puede repetir la aplicación por la noche.
El tiempo necesario para el recrecimiento del cabello con Minoxidil para hombre, puede ser de dos meses con el uso de 2 veces por día; en algunos hombres pueden transcurrir al menos 4 meses para que se observen los resultados. La cantidad de cabello recrecido es diferente para cada persona. Minoxidil puede no actuar en todos los hombres. Si la pérdida de cabello es importante, o se ubica en la parte frontal de la cabellera, Minoxidil puede no ser efectivo.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicado en aquellos individuos que han mostrado hipersensibilidad al Minoxidil o a alguno de los componentes de la fórmula; enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, piel irritada, psoriasis de cuero cabelludo, embarazo, lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No utilizar en mujeres, puede provocar el crecimiento del pelo facial y puede ser peligroso si es utilizado durante el embarazo o la lactancia.
No utilizar si no está seguro de la causa de la pérdida de su cabello.

IN0251

No utilizar en menores de 18 años (ni en bebés ni en niños).
No utilizar cuando se empleen otros medicamentos sobre el cuero cabelludo.
No utilizar cuando no tenga antecedentes familiares de pérdida de cabello.
No utilizar si tiene una pérdida desigual o súbita del cabello.
Lavar cuidadosamente las manos luego de haberse aplicado la solución.
Evitar el contacto con los ojos. En caso accidental, lavar con grandes cantidades de agua fría.
No utilizar secador de cabello para acelerar el secado del mismo luego de la aplicación de la solución.
No acostarse hasta que hayan transcurrido por lo menos 30 minutos de la aplicación, de modo de evitar que el medicamento permanezca en la almohada.
No colocar sobre la piel inflamada, erosionada o escoriada, ya que el fármaco podría absorberse en cantidad suficiente como para producir efectos sistémicos: edema local y general, pericarditis, taponamiento cardíaco, taquicardia, incremento de peso, aumento del riesgo de angina de pecho e insuficiencia cardíaca.
En pacientes de riesgo que utilicen Minoxidil deben monitorearse la presión arterial, el pulso, y el peso.
Uso externo solamente.

REACCIONES ADVERSAS

Dermatitis, prurito, rash. Más raramente: reacciones alérgicas, aumento de alopecia, eritema de cuero cabelludo, eczema foliculitis, cefaleas, disfunción sexual y trastornos de la visión. En caso de absorción sistémica importante: dolor torácico, palpitaciones, hipotensión, retención hidrosalina, vasodilatación, piel seca.

INTERACCIONES

Los corticoides tópicos, retinoides tópicos y petrolatos tópicos incrementan la absorción de Minoxidil.

SOBREDOSIFICACION

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666 / 2247, Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACION

TRICOLOCION 5% Solucion tópica: Envases conteniendo un frasco de 120 ml de solución tópica.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
CONSERVAR PREFERENTEMENTE ENTRE 5 °C Y 30 °C,
AL ABRIGO DE LA LUZ Y LA HUMEDAD, EN SU ENVASE ORIGINAL.

Industria Argentina. **Venta libre.**
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 46.651.
Directora Técnica: Viviana Silvia Rivas, Farmacéutica y Bioquímica.
Elaborado en Teodoro Vilardebó 2839/45/55/65, C1417AHO Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de última actualización: Octubre de 2006.

Investi Farma S.A.
Lisandro de la Torre 2160, C1440ECW Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Información al Consumidor 4346-9910

INVESTI
CUERPO Y ALMA

B 1242402841
IN0251 1009 (22)